

**Termo informativo de consentimento para realização de
COLONOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA**

O EXAME: Procedimento com duração aproximada de 30 minutos que visualiza as porções do seu intestino grosso, utilizando um tubo flexível introduzido através do ânus, com a finalidade de estudar o interior do reto e sigmoide (e cólon descendente, transverso e ascendente no caso de colonoscopia). Se houver necessidade durante o procedimento, pode ser coletado material para exame (biópsia) e análise laboratoriais detalhada. Pequenos tumores (pólipos) podem ser removidos a critério médico; sangramentos podem ser diagnosticados, e muitas vezes, tratados durante o próprio exame.

RISCOS: A retossigmoidoscopia/colonoscopia pode resultar em complicações como: apnéia (parar de respirar), infecção, flebites (inflamação da veia), arritmia cardíaca, reações anafiláticas (alérgicas), broncoaspiração, perfuração de intestino e sangramentos, que embora raros, podem requerer tratamento clínico ou cirúrgico urgente.

PREPARO: Para permitir uma visão clara, o intestino grosso deve estar completamente limpo e sem resíduos. O paciente deverá fazer, na véspera, uma dieta líquida, sem resíduos, e tomar o laxante de acordo com as orientações da equipe. Após a ingestão do laxante é importante tomar bastante líquido, que poderá ser água, chá, água-de-côco, Gatorade (isotônicos), sucos de laranja ou limão, caldos de frango e legumes coados em peneira bem fina. “Não pode ser liquidificado”. É importante ingerir líquidos, no mínimo 2 litros/dia. No dia do procedimento você deverá se apresentar a clínica no horário estipulado, em jejum absoluto de 8 horas (não beber nem água). Será necessário puncionar acesso venoso para infusão de medicação sedativa para maior conforto durante o exame.

Se você é portador de DOENÇAS CARDÍACAS, NEUROLÓGICAS, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES, ALERGIAS e/ou faz uso de MEDICAÇÕES ou MARCA-PASSO CARDÍACO, favor informar a equipe médica que irá lhe orientar. Todas as informações sobre seu estado de saúde devem ser reportadas para que providências cabíveis sejam tomadas previamente a realização do exame.

Em decorrências dos efeitos da medicação sedativa, você não poderá conduzir veículos, ou ser conduzido para sua residência em motocicleta, nem exercer **ATIVIDADES DE RISCO**, que necessitem de atenção nas 12 horas seguintes, nem poderá fazer uso de bebidas alcoólicas até 48 horas após o término do exame. É necessário a presença de um ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS, para auxiliá-lo após o exame. Traga uma toalha de rosto no dia do procedimento e uma vestimenta extra.

APÓS O PROCEDIMENTO: Você permanecerá em repouso numa sala de recuperação até ser liberado pelo médico após neutralização do efeito sedativo ou anestésico. Em razão do preparo a que o intestino foi submetido e a fim de facilitar sua digestão, você deverá retomar gradativamente à dieta normal no dia seguinte.

QUESTÕES/DÚVIDAS: É importante que você informe ao seu médico se ocorrerem sintomas como dor, fezes pretas, febre ou vômitos nas primeiras 24 horas após o exame. Caso ainda tenha dúvida sobre o exame entre em contato com a equipe que irá saná-las.

Declaro ter lido as informações acima e concordo em fazer o exame:

PACIENTE (ASSINATURA): _____

NOME: _____ IDADE _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____

RESPONSÁVEL LEGAL (ASSINATURA): _____

NOME: _____ IDADE _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____

GRAU DE PARENTESCO: _____

_____, _____ de _____ de 2016.